

OFICIUL FITOSANITAR GORJ
Tg Jiu, Bd. E. Teodoroiu, nr. 521
Nr. 374 /OF/ 04.04.2022

tel : 0253249043
fax: 0253249043
mail: dfggorj@yahoo.com

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 5 din 04.04.2022

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunatorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile din grupa :

SAMBUROASE (PIERSIC, CAIS, CIRES, VISIN)



Monilioza flori și ramuri



monilioza fructe



Rapan mar

Boli (monilioza produsă de ag.patogen –Monilinia spp., ciuruirea produsă de agentul patogen – Coryneum b., patarea roșie produsă de agentul patogen –Polystigma rubrum), basicarea frunzelor de piersic produsă de agentul patogen –Taphrina deformans)
Daunatori : paduchele din San Jose forme hibernante (Quadraspidotus perniciosus), afide-Aphis , omizi defoliatoare –ponte, acarieni , paduchele testos (Parthenolecanium sp).

Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

-boli infecție primară și prezența daunatorilor

Se recomandă folosirea unuia din produsele sau amestecurile de mai jos :

- VONDOZEB (MANZATE) =0,2% + FASTAC 10 EC =0,02% sau
- ALCUPRAL 50 PU=0,2%(2 kg/ha) +(FASTER DELTA)DELTA GRI =0,025-0,3 l/ha sau
- SIGNUM (SYREX STAR) =0,05% + KARATE ZEON =
- LUNA EXPERIENCE 400SC =0,5 l/ha + PYRINEX 48 EC =0,2 %

Perioada optimă de tratament : la dezmuguritul mugurilor floriferi (10-15% din mugurii florali deschisi)

Se vor folosi numai produse de protecția plantelor omologate.

Cititi cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați

Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,manusi) la manuirea produselor de protectia plantelor. Nu deversati solutiile de stropit pe sol ,langa cursuri de apa,canale de scurgere ,suprafete de beton.Cantitatea de solutie la ha este de 1000 litri si aplicati tratamentul in conditii favorabile fara vant si ploi.Clatiti de 3 ori recipientele si livrati ambalajele la operatorii economici care efectueaza neutralizarea acestora <program SCAPA >accesati www.aiprom.ro.Fermierul trebuie sa anunte Primaria si pe toti crescatorii de albine pe o raza de 3 km de locul unde se executa tratamentul si perioada cand se executa. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”Se vor respecta cu strictete cerintele de agromediu,clima ,sol si silvomediu conform normelor Programului de Dezvoltare Rurala masurile(M10,M11,M13,M15).

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA,Ord. nr. 68/1992 al M.Mediului, Ord. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,Ord. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si Ord. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (nr.103 /21.10.2016) privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp. **Atentionare!**

Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină dupa urmatorul model:

Nume si prenume fermier(S.C.)I.L.:A.F-----
 Domiciliu fermier(sediul societatii)-----
 Ferma-----

Registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor.

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data inceperii Recoltării produsului agricol	Nr. si Data Documtului prin care s-a dat in consum populaț
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosita	Suprafata (ha)	Cantit. Utilizate (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționeaza cate pagini conține registrul, purtand semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR O.F.GORJ
TATU ION



INTOCMIT
UNGUREANU C-TINA

OFICIUL FITOSANITAR GORJ
Tg Jiu, Bd. E. Teodoroiu, nr. 521
Nr.375/OF / 04.04.2022

tel : 0253249043
fax: 0253249043
mail; dfggorj@yahoo.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr . 6 din 04.04.2022

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile din grupa :

SEMINTOASE(MAR,PAR,GUTUI)



Gargarita florilor de mar



Monilioza gutui

Boli: (rapan-produsa de agentul patogen *Venturia inaequalis*, monilioza –produsa de ag.patogen *Monilinia spp.*, fainare –produsa de ag.patogen *Podosphaera l.*) și daunători (gargarita florilor de mar-*Anthonomus pomorum*, afide –*Aphis spp.*, acarieni, paduchele lanos -*Eriosoma lanigerum*, oua insecte defoliatoare).

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

- boli infecție primară
- prezența daunătorului

Pentru limitarea populației daunătorului –gargarita florilor de mar, preventiv se fac scuturări

Se recomandă a se folosi unul din amestecurile de mai jos

SCALA =0,175-1 L/HA + DELTAGRI =0,075%- 0,04 l/ha sau

MERPAN 80 WDG(CAPTADIN 80 WDG)=2 kg/ha +POLECI (DECA)=0,03%-0,05%

-ALCUPRAL 50 PU =0,2 -0,3 % + DECIS 25 WG =0,045 kg/ha (0,003 %) sau
{4,5 kg/ha la mar /1500 l apa }

3kg/ha la par /1000 l apa

SCORE 250 EC = 0,015% + FASTAC 10 EC(NINJA) =0.02%

Perioada optimă de tratament este atunci când 10-15 % din mugurii florali sunt la dezmugurit și la gargarita florilor de mar PED (PRAGUL ECONOMIC DE DAUNARE) de 5 adulți pe pom

Pentru boala focul bacterian produsă de agentul patogen *ERWINIA AMYLOVORA* se fac

tratamente cu unul din următoarele produse de protecția plantelor :

- AIRONE SC(272 g /l cupru) =3 l/ha (de la deschiderea primelor flori până la sfârșitul înfloritului)

- TRIUMPF 40 WP = 0,25% (3,750 kg/ha la 1500 l apa la mar și 2,5 kg /ha la 1000 litri apa la par)

Citiți cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Respectati timpul de pauza pentru fiecare produs .Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,manusi) la manuirea produselor de protectia plantelor.

Nu deversati solutiile de stropit pe sol ,langa cursuri de apa,canale de scurgere ,suprafete de beton.Cantitatea de solutie la ha este de 1500 litri si aplicati tratamentul in conditii favorabile fara vant si ploaie.Clatiti de 3 ori recipientele si livrati ambalajele la operatorii economici care efectueaza neutralizarea acestora <program SCAPA >accesati www.aiprom.ro . Luati masuri pentru protectia mediului ,animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA,Ord. nr. 68/1992 al M.Mediului, Ord. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,Ord. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si Ord. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (nr.103 /21.10.2016 privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare!

Conform prevederilor legale prevazute in:Regulamentul (C.E)nr 1107/2009 art .67 (1) ;H.G ,nr 1559/2012; O.G.NR .4/1995 ;O.G.41 /2007;OM 352/2015 si SMR 10 fiecare utilizator (persoane fizice sau juridice)de produse de protectia plantelor trebuie sa detina dupa urmatorul model:.

FERMIER sau(S.C. , I.I., A.F.) _____

Sediul (Adresa) _____

Ferma _____

REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE

Data efectuării tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populație
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosita	Suprafata (ha)	Cantit. Utilizate (kg,l.)			

Producatorul agricol numereaza paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societății.

COORDONATOR O.F. GORJ
TATU ION



INTOCMIT
UNGUREANU C-TINA

OFICIUL FITOSANITAR GORJ

Tg Jiu, Btl. E. Teodoroiu, nr. 521

Nr.382/ OF / 05.04.2022

tel : 0253249043

fax: 0253249043

mail; dfggorj@yahoo.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 07 din 05. 04. 2022

A preveni este mai simplu decat a vindeca**

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunatorilor care pot cauza pierderi importante la culturile de legume verzi:

SALATA SI SPANAC



Melci fara cochilie

Gryllotalpa.g-coropisnita

Salata

Boli :mana salatei produsa de Bremia lactuceae ,putregaiul cenușiu –Botrytis cinerea ,

Daunatori: paduchii de frunze , melcii fara cochilie si coropisnita –Gryllotalpa g.

Spanac

Boli :mana spanacului –Peronospora spinaciae

Daunatori: paduchele negru de frunze –Doralis fabae,melcii fara cochilie si coropisnita.

Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

-boli infecție primară și prezenta daunatorilor

Se recomandă folosirea unuia din produsele sau amestecurile de mai jos :

-SIGNUM =1,5 kg/ha + DELTAM = 8 ml /10 l apa /100 mp sau

-ORTIVA TOP = 1 l/ha + DECIS EXPERT 100 EC =62,5 ml /ha sau

TAEGRO = 0,37 kg/ha + FASTAC 10 EC = 0,02 % sau

CUPROFIX ULTRA= 1,4-1,8 kg/ha + DELTAGRI =0,24- 0,5 L/HA

Pentru combaterea melcilor fara cochilie și coropisnite vor folosi unul din produsele :

SLIMAX =7 kg/ha sauALLOWIN =5 kg/ha sauMETA GOLD 3%=7 kg/ha

Tratamentul se executa preventiv si curativ .

Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare .

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-EXPERT.Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,manusi) la manuirea produselor de protectia plantelor.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementareaAgenția Națională Fitosanitară și Asociatia Crescatorilor de Albine din România, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare! .

Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină dupa urmatorul model :

FERMIER(SC.;I.I;AF.)-----

Sediul(adresa-----

Ferma-----

Registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data inceperii Recoltării produsului agricol	Nr. si Data Documentului prin care s-a dat in consum populație
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosita	Su- pra- fata (ha)	Cantit. Utili- zate (kg,l.)			

(Comform Reg. CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

COORDONATOR O.F. GORJ
TATU ION



INTOCMIT
UNGUREANU.C-TINA


BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 8 din 05.04.2022

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante la plantele de :

RAPITA



Gargarita tulpinilor de rapita adult și larve



putregaiul alb al tulpinilor la rapita

Boli : putregaiul alb (*Botrytis cinerea*), putregaiul negru (*Phoma l.*), alternarioza (*Alternaria b.*)
Daunatori: puricii (*Phyllotreta a.* și *Phyllotreta nemorum*), gargarita tulpinilor de rapita (*Ceuthorynchus napi*)

Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomandă executarea tratamentului numai atunci când pragul economic de daunare (PED, când frecvența plantelor atacate de gargarita tulpinilor este de 3-10 % iar pentru purici este de 10-25 % plante atacate). Gargarita hibernează în sol ca adult și începe migrarea în condiții neastepate, când temperatura solului la 2 cm adâncime ajunge la 6 grade C. Perioada de activitate începe în ferestrele iernii la temperaturi cu valori mai mari de 6 grade C. Adultii depun pona pe tulpina către varf, larvele rod galerii în maduva tulpinilor și se încetineste creșterea plantelor, ramifica bogat, sunt sensibile la cadere formează silicve seci și cu semințe de slabă calitate. Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

-prezența daunătorilor și infecție primară la boli

Folosiți unul din produse de protecția plantelor sau amestecurile următoare după caz :

- 1) AMISTAR =0,75-1 L/HA +CYPERGUARD MAX=0,05 L/HA sau
- 2) FOLICUR SOLO 250 EW =1 l/ha +DELMETROS 100 SC(KORON 100EC)=0,05 L/HA sau
- 3) MOSPILAN 20 SG(KRIMA 20 SG) =0,2 kg/ha + MATIZ(ERASMUS) =1 l/ha sau
- 4) ZIZAN 500 SC =0,5 l/ha + KAISO SORBIE 5 EC=0,150 kg/ha

Cantitatea de apă folosită la ha este 300-500 l.

Perioada optima de tratament : prezenta daunatorilor in culturi iar tratamentul II se va repeta daca atacul persista .

. Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare .
Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest si dati cautare in PEST-EXPERT .Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,cizme)la manuirea produselor de protectia plantelor.Atentie la PRIMARI -afisati buletinele de avertizare la loc vizibil pentru fermierii dumneavoastra.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si

utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>. „Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementareaAgenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicatiilor cu ppp.
Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină dupa urmatorul model:

FERMIER (S.C.,I.L.,A.F.)-----
Sediul(adresa) -----
Ferma(sediul) -----

REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatuura	Data inceperii Recoltării produsului agricol	Nr. si Data Documer tului prin care s-a dat in consum populație
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori / buruieni	Den u- mire a Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosita	Su- pra - fata (ha)	Cantit Utili- zate (kg,l.)			

(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR O.F. GORJ
TATU ION



INTOCMIT
UNGUREANU CONSTANTINA