




Autoritatea Națională Fitosanitară

B. Ștef. Volintari nr. 11
Voluntari 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



OFICIUL FITOSANITAR GORJ
Tr. Juc. Bd. E. Teodoroiu, nr. 521
Nr.24 O. 25.05.2022



tel : 0253249043
fax: 0253249043
mail:dfggorj@yahoo.com

BULETIN DE AVERTIZARE

NR.24 din 25 mai 2022

.. A preveni este mai simplu decat a vindeca"

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile din grupa :

SEMINTOASE (mar,par,gutui)

● Boli :răpan (Venturia i și Venturia p), monilioza (Monilinia f. și Monilinia l.) și fainarea marului (Podospaera leucotricha).
Daunatori :viermele merelor (Carpocapsa pomonella –GI), paduchele lanos (Eriosoma l.), insecte și omizi defoliatoare afide, acarieni

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului I G I la viermele merelor numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

- boli infecție secundară
- prezența daunătorilor

Folositi una din combinatiile de mai jos dupa caz :

SCORE 250 SC 0,2 l/ha + CYPERGUARD 25 EC(FOSTOC)=0,08 l/ha(0,008%)sau
KAPLAN 80 WG=1,8-1,9 kg/ha + KARATE ZEON(NINJA)=0,015 % sau

MOLINA =0,4 L/ ha +KAISO SORBIE 5EG(REXARIS) =0,015%(0,225 kg/ha in 1500 l apa)sau

● MERPAN 80 WDG =0,15% +KUMULUS DF =0,3%+DELTA GRI(FASTER DELTA) =0,375-0,4 L/HA

LUNA EXPERIENCE 400 = 0,75 L/ha + POLECI =0,03 % -0,075%(30 - 75 ml/hl apa)

La viermele merelor (Laspeyresia spp)

Perioada optimă de tratament : 29 mai -2 iunie 2022 trat .I iar trat.II G I la vierme se va repeta la 10-12 zile de la primul.

La prezența acarienilor peste pragul economic de daunare de 5 daunatori se va folosi alături de una din combinațiile de mai sus și un acaricid : NISSORUN 10 WP =0,03 % sau MILBECNOCK EC =0,05 %.

Aplicati tratamentul imediat cand sunt conditii favorabile de temperatura, fara ploi,zile calme fara vant pentru a reduce la minim riscul de a ajunge solutia pe culturile din jur.

. Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare .

Se pot utiliza și alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :http://www.madr.ro/ro /fitosanitar.html-https://aloe.anfd.ro, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest și dati cautare in PEST-EXPERT.Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,cizme)

- ORTIVA TOP =0,1 % +FASTER DELTA(DELTAGRI)=0,3-0,4L /ha(0,6 L/ha la Colorado)sau
- CURZATE MANOX =2,5 kg/ha+CORAGEN =175ml/ha/
- CABRIO TOP =1,5 -2 KG/HA + SHERPA 100 EC = 0,3 L/ HA sau
- DAGONIS =0.6 - 1 l/ha(0,6 l/ la castraveti) + MAVRIK 2F = 0,2 L/HA

Perioada optima de tratament 29 mai- 2- Iunie 2022 iar tratamentul II la 8-10 zile de la primul tratament.

Aplicati tratamentul imediat cand sunt conditii favorabile de temperatura, fara ploi,zile calme fara vant pentru a reduce la minim riscul de a ajunge solutia pe culturile din jur. Alternati produsele de protectia plantelor pentru a nu se crea forme de rezistenta ale agentilor de daunare. Respectati timpul de pauza pentru fiecare produs.

. Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare .

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,cizme)

la manuirea produselor de protectia plantelor.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.” Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al

Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină dupa urmatorul model:

Nume si prenume fermier-----

Domiciliul-----

Ferma—sediul exploatareii-----

Registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat				Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data inceperii Recoltării produsului agricol	Nr. si Data Documertului prin care s-a dat in consum populație
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosita	Su- pra- fata (ha)			

(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numereaza paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societății.

COORDONATOR O.F. GORJ
TATU ION

INTOCMIT
UNGIUREANULC.TINA